

Paramyxowiroza

Opis choroby:

Paramyxowiroza jest to zakaźna choroba wirusowa. Jest groźna zarówno dla gołębi młodych jak i dorosłych. Wirus rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z chorym osobnikiem a także poprzez zanieczyszczony pokarm i wodę.

Objawy i przebieg choroby

Z początku obserwuje się zwiększoną płochliwość, utratę apetytu, wzmożone pragnienie. Do tych objawów dochodzi (kał wygląda jak długa nitka oblana kałużą) a następnie zaburzenia układu nerwowego – skręcenie szyi (utrudnia albo wręcz uniemożliwia pobieranie pokarmu i wody), paraliż, nieskoordynowane ruchy. Niektóre ptaki zaatakowane wirusem paramyxo padają bardzo szybko. Inne po przechorowaniu wracają do całkowitego zdrowia i mogą brać udział w lotach. Zdarza się jednak, że do końca życia u tych ptaków, które przeszły chorobę, widoczne są niedowłady czynnościowe.

Leczenie i profilaktyka:

W zasadzie nie ma skutecznych środków zwalczających paramyxowirozę w trakcie jej trwania.

Profilaktyka: Szczepienia ochronne. Powinny być przeprowadzone jak najwcześniej – najlepiej tydzień po odsadzeniu młodego od matki, można także w wieku trzech tygodni w przypadku szczególnego zagrożenia chorobą. Zaleca się dwukrotne szczepienie młodych gołębi, które daje znacznie większą odporność i pobudza system immunologiczny gołębia. Poza tym oczywiście należy szczególnie dbać o higienę, czyścić gołębnik jak najczęściej, zmieniać wodę i podawać świeży i wartościowy pokarm.

<http://centrumzdrowiagolebi.pl/poradniki/artykuly/choroby-golebi/paramyxowiroza/>