

Kokcydioza (krwawa biegunka)

Opis choroby:

Jest jedną z częściej spotykanych pasożytniczych chorób gołębi. Wywołują ją pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Większość gołębi jest nosicielami kokcydiów – nie obserwuje się u nich objawów choroby ale z kałem wydalają oocysty (przetrwalnikowe formy pasożyta), stanowiąc potencjalne ognisko choroby.

Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z chorym osobnikiem, bądź przez przebywanie na terenie skażonym odchodami chorych gołębi. Kokcydioza w znaczący sposób obniża kondycję gołębi, jest jednym z najczęstszych czynników otwierających wrota zakażenia dla innych patogenów.

Objawy i przebieg choroby:

Objawami kokcydiozy są: brak apetytu, apatia, biegunka – na skutek uszkodzenia nabłonka jelita. Biegunka jest rzadka, wodnista, czasami śluzowa. Zniszczenie śluzówki jelita to doskonała droga zakażenia dodatkowymi chorobami – salmonellozą, trichomonadozą itp. Należy jednak pamiętać, że objawy te nie są specyficzne jedynie dla kokcydiozy – dlatego też w celu potwierdzenia podejrzeń należy przeprowadzić badanie kału na obecność dużej ilości oocyst.

Leczenie i profilaktyka:

W profilaktyce kokcydiozy niezwykle istotne jest dbanie o czystość i higienę w gołębniku, oraz o ogólny dobry stan gołębi. Poza tym konieczne jest okresowe, profilaktyczne uwalnianie gołębi od kokcydii, nawet jeśli nie obserwujemy żadnych objawów choroby. W łagodnych niewielkich inwazjach należy dążyć do podniesienia ogólnej odporności ptaków i niszczenia oocyst w środowisku gołębia.

Źródło: <http://centrumzdrowiagolebi.pl/poradniki/artykuly/choroby-golebi/kokcydioza-krwawa-biegunka/>